

# INFORMACJA DO S-32

**z dnia 04.06.2010r.**

## **o zwalczaniu miodówek gruszowych**

**Sadom gruszowym zagrażają miodówki, należy stosować opryskiwania wg podanego programu :**

**I. TERMIN** - *w fazie nabrzmiewania pąków w temp. powyżej +15<sup>0</sup> C, w słoneczny dzień, stosując :*

<b>ACTARA 25 WG</b>	<b>w dawce</b>	<b>0,16-0,2 kg/ha</b>
<b>ADMIRAL 100 EC</b>	<b>„</b>	<b>0,75 l/ha</b>

**II. TERMIN** - *tuż przed kwitnieniem ( biały pąk kwiatowy )*

<b>RIMON 100 EC</b>	<b>„</b>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>ADMIRAL 100 EC</b>	<b>„</b>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>DIMILIN 25 WP</b>	<b>„</b>	<b>0,6 – 0,9 kg/ha</b>

**III. TERMIN** - *po kwitnieniu –*

<b>ACTARA 25 WG</b>	<b>w dawce</b>	<b>0,16-0,2 kg/ha</b>
<b>RIMON 100 EC</b>	<b>„</b>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>ADMIRAL 100 EC</b>	<b>„</b>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>DIMILIN 25 WP</b>	<b>„</b>	<b>0,6 – 0,9 kg/ha</b>

**IV. TERMIN** - *okres wzrostu owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków*

<b>ACTARA 25 WG</b>	<b>w dawce</b>	<b>0,16-0,2 kg/ha</b>
<b>RIMON 100 EC</b>	<b>„</b>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>ADMIRAL 100 EC</b>	<b>„</b>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>DIMILIN 25 WP</b>	<b>„</b>	<b>0,6 – 0,9 kg/ha</b>

### **UWAGA !**

1. Do cieczy roboczej **należy koniecznie dodać zwilżacz.**

*Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin*