

# INFORMACJA DO **S-47**

## z dnia 04.06.2010

### o zwalczaniu nasionnicy trześniówki

#### UWAGA SADOWNICY !

Wylot much nasionnicy trześniówki rozpoczyna się zazwyczaj w końcu maja lub na początku czerwca, zbiegając się w czasie z kwitnieniem robinii pseudoakacji.

W tym terminie, najlepiej na podstawie obserwacji żółtych pułapek lepowych, należy przeprowadzić opryskiwanie **czereśni odmian późnych** przeciwko nasionnicy trześniówce jednym z niżej podanych środków ochrony roślin:

Zalecane środki	Dawka na 1 ha	Karencja
<b>CALYPSO 480 SC</b>	<b>0,1 l</b>	<b>14 dni</b>
<b>MOSPILAN 20 SP</b>	<b>0,125 kg</b>	<b>14 dni</b>

W temperaturze poniżej + 20<sup>0</sup> C można stosować:

<b>BULLDOCK 025 EC</b>	<b>0,75</b>	<b>7 dni</b>
<b>DECIS 2,5 EC</b>	<b>0,6 l</b>	<b>7 dni</b>
<b>FASTAC 100 EC</b>	<b>0,15-0,18 l</b>	<b>7 dni</b>

#### UWAGA !

1. Zabieg powtórzyć po 7 dniach z zastosowaniem środków z okresem karencji do 10 dni

*Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.*