

# INFORMACJA DO S-26, S27

z dnia 16.06.2011

## o zwalczaniu zwójek uszkadzających owoce jabłoni i I pokolenia owocówki jabłkówekczki w fazie rozwojowej jaj „czarna główka”

Nastąpiły masowe loty zwójki wydłubki oczateczki. W ciągu kolejnych 2-3 dni pierwsze pokolenie owocówki jabłkówekczki będzie znajdowało się w fazie „czarnej główki”

Zalecane środki:

Dawka na 1ha

<b>RIMON 100 EC</b>	<b>0,75 l</b>
<b>DIMILIN 480 SC</b>	<b>0,3 l</b>
<b>CALYPSO 480 SC</b>	<b>0,2 l</b>
<b>MOSPILAN 20 SP</b>	<b>0,2 kg</b>
<b>SPIN TOR 240 SC</b>	<b>0,6-0,8 l</b>
<b>RUNNER 240 SC</b>	<b>0,4 l</b>
<b>STEWARD 30 WG</b>	<b>0,2 kg</b>

**UWAGA !**

**CALYPSO, MOSPILAN, SPINTOR** – zwalczają gąsienice owocówki, które zdążyły się wgryźć do jabłek

**Przed zabiegiem należy wykosić kwitnące chwasty pod drzewami.** Zwracać uwagę, aby nie opryskiwać plantacji truskawek, porzeczek, warzyw i innych upraw.

*Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.*