

# INFORMACJA DO **S- 27**

**z dnia 13.07.2011**

## **o zwalczaniu II pokolenia owocówki jabłkówekczki w okresie lotu motyli, zwójek liściowych i innych gąsienic zjadających liście**

Nastąpił intensywny lot motyli drugiego pokolenia owocówki jabłkówekczki, oraz zwójki korówekczki.

W okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj należy stosować następujące preparaty:

<b>Zalecane środki:</b>	<b>Dawka na 1 ha</b>
<b>RIMON 100 EC</b>	<b>0,75 l</b>
<b>DIMILIN 480 SC</b>	<b>0,3 l</b>
<b>CALYPSO 480 SC</b>	<b>0,2 l</b>
<b>MOSPILAN 20 SP</b>	<b>0,2 kg</b>
<b>STEWARD 30 WG</b>	<b>0,2 kg</b>

### **UWAGA!**

1. Dokładny termin zwalczania najlepiej ustalić na podstawie obserwacji odłowu motyli w pułapkach feromonowych.
2. Środki **CALYPSO 480 SC**, **STEWARD 30 WG** stosować w okresie masowego składania jaj
3. Zastosowany zabieg na owocówkę jabłkówekczkę zwalcza również gąsienice zwójek.
4. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących okresów karencji.

*Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.*

# INFORMACJA DO **S- 31**

**z dnia 13.07.2011**

## **o zwalczaniu II pokolenia owocówki śliwkóweczki**

Nastąpił intensywny lot motyli drugiego pokolenia owocówki śliwkóweczki, W okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj należy stosować następujące preparaty:

<b>Zalecane środki:</b>	<b>Dawka na 1 ha</b>
<b>DIMILIN 480 SC</b>	<b>0,3 l</b>
<b>CALYPSO 480 SC</b>	<b>0,2 l</b>
<b>MOSPILAN 20 SP</b>	<b>0,2 kg</b>
<b>STEWARD 30 WG</b>	<b>0,2 kg</b>

**UWAGA!**

**Zalecane opryskiwanie winno być wykonane wyłącznie na późnych odmianach śliw, ściśle przestrzegając obowiązujących okresów karencji**

1. Dokładny termin zwalczania najlepiej ustalić na podstawie obserwacji odłowu motyli w pułapkach feromonowych.
2. Środki **CALYPSO 480 SC**, **STEWARD 30 WG** stosować w okresie masowego składania jaj

*Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.*