

INFORMACJA DO **S - 18**

z dnia 12.05.2010r.

o zwalczaniu owocnicy jabłkowej

W sadach, w których w roku ubiegłym stwierdzano uszkodzenia owoców przez owocnicę jabłkową, należy wykonać opryskiwanie stosując jeden z zalecanych środków ochrony roślin w terminie **pod koniec opadania płatków kwiatowych - sukcesywnie poszczególne odmiany:**

ZALECANE ŚRODKI	DAWKA na 1 ha	PREWENCJA
ACTARA 25 WG	0,16- 0,2 kg	6 godz.
CALYPSO 480 SC	0,1 l	-

UWAGA !

Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykosić kwitnące chwasty pod drzewami.

Wymienione preparaty zwalczają również mszyce.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO **S-32**

z dnia z dnia 12.05.2010r. **o zwalczaniu miodówek gruszowych**

Sadom gruszowym zagrożają miodówki, należy stosować opryskiwania wg podanego programu :

I. TERMIN - w fazie nabrzmiewania pąków w temp. powyżej +150 C, w słoneczny dzień, stosując :

ACTARA 25 WG w dawce 0,16-0,2 kg/ha

ADMIRAL 100 EC w dawce 0,75 l/ha

II. TERMIN - tuż przed kwitnieniem (biały pąk kwiatowy)

RIMON 100 EC w dawce 0,75 l/ha

ADMIRAL 100 EC w dawce 0,75 l/ha

DIMILIN 25 WP w dawce 0,6 – 0,9 kg/ha

III. TERMIN - tuż po kwitnieniu –

RIMON 100 EC w dawce 0,75 l/ha

ACTARA 25 WG w dawce 0,16-0,2 kg/ha

ADMIRAL 100 EC w dawce 0,75 l/ha

DIMILIN 25 WP w dawce 0,6 – 0,9 kg/ha

IV. TERMIN - okres wzrostu owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków

ACTARA 25 WG w dawce 0,16-0,2 kg/ha

RIMON 100 EC w dawce 0,75 l/ha

ADMIRAL 100 EC w dawce 0,75 l/ha

DIMILIN 25 WP w dawce 0,6 – 0,9 kg/ha

UWAGA !

1. Do cieczy roboczej należy dodać zwilżacz.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin

INFORMACJA DO **S-29**

z dnia 12.05.2010r.

o zwalczaniu przędziorków i szpecieli w sadach śliwowych

W sadach śliwowych, gdy liczebność przędziorków wynosi powyżej 3 sztuk na liść należy wykonać opryskiwanie stosując:

I Środki zwalczające przędziorki

Zalecane środki:	Dawka na 1ha
MAGUS 200 SC	0,5 – 0,7 l
OMITE 570 EW	1,5 - 2,0 l
ORTUS 05 SC	1,0 l

II. Środki zwalczające przędziorki i szpeciele

Zalecane środki:	Dawka na 1ha
OMITE 570 EW	2,0 l
ORTUS 05 SC	1,25 – 1,5 l

UWAGA !

1. Do cieczy roboczej **należy dodać zwilżacz.**
2. **Magus** – niszczy również jaja letnie przędziorków
3. **Omite** – stosować w temperaturze pow. 20°C

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.